


Vacina contra a cólera e suas indicações

Helena Sato

Divisão de Imunizações do CVE



Vacina cólera




- **Vacina inativada (Dukoral®)**
- **Composição: quatro cepas (Clássica, El Tor, Inaba e Ogawa) e subunidade B da toxina colérica**
- **Via de aplicação: oral**
- **Esquema de vacinação**
 - **Crianças entre 2 e 5 anos de idade: 3 doses com intervalo de 7 dias**
 - **Crianças maiores que 5 anos de idade e adultos: 2 doses com intervalo de 7 dias**
- **Início da proteção: 7 dias após completar o esquema**
- **Eficácia: 50 a 86%**

Vacina cólera



- **Vacina inativada (Shanchol®)**
- **Composição: grupo O 1 e O 139**
- **Via de aplicação: oral**
- **Esquema de vacinação**
 - **Crianças acima de 1 ano de idade e adultos: 2 doses com intervalo de 14 dias**
 - **Reforço após 2 anos**
- **Eficácia: 50 a 80%**

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO DE RESPOSTAS COORDENADAS



Fonte: Adaptado de slide SVS/MS

PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO DE RESPOSTAS

Imunização

- Medida adicional para as fases de prevenção/preparação e contenção
- Recomendações adotadas pela OMS




Vacina cólera

- **Para a Copa: vacinar grupos de risco quando em contato com os casos não autóctone para impedir a transmissão**
- **Para o futuro: vacinar turistas e trabalhadores que irão para áreas endêmicas/epidêmicas**
- **Na fase de contenção: vacinar para impedir o alastramento da cólera como medida complementar**

Grata!

www.cve.saude.sp.gov.br



CVE
Centro de Vigilância Epidemiológica
"Prof. Alexandre Vranjac"

**GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO**
Secretaria da Saúde