



Secretaria de
Saúde



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO







16ª Campanha Estadual de Testagem do HIV e da Sífilis - **FIQUE SABENDO 2023**

A importância da Sífilis na Campanha

Roberto José Carvalho da Silva, MD, PhD

Interlocutor do Programa Estadual de DST/Aids SP

Prof. Medicina do Centro Universitário FAM





Brasil, período de 2011 a 2021




1.035.942 casos de sífilis adquirida

466.584 casos de sífilis em gestantes

221.600 casos de sífilis congênita



2.064 óbitos por sífilis congênita.



São Paulo, período de 2007 a 2022



334.478 casos de sífilis adquirida

114.352 casos de sífilis em gestantes

47.989 casos de sífilis congênita




634 óbitos por sífilis congênita.*

*1986 a 2022



Casos notificados de sífilis adquirida e taxa de detecção de sífilis adquirida por 100.000 habitantes segundo o ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 2007 a 2021*.




Fonte: SINAN -Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual de DST/Aids-SP (VE-PE DST/AIDS-SP).

Nota: * Utilizada projeção populacional da Fundação Seade.

** Dados preliminares até 30/06/2022 sujeitos a revisão mensal.



Taxa de detecção de sífilis adquirida por 100.000 habitantes segundo sexo e ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 2007 a 2021*.



Fonte: SINAN -Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual de DST/Aids-SP (VE-PE DST/AIDS-SP).

Nota: * Utilizada projeção populacional da Fundação Seade.

** Dados preliminares até 30/06/2022 sujeitos a revisão mensal.



Características selecionadas da Sífilis no estado de São Paulo

- Tendência de elevação dos casos e taxas de detecção por 100.000 habitantes de sífilis adquirida;
- Redução do número de casos e taxa de detecção em 2020, pontual, provavelmente em decorrência da pandemia da Covid-19;
- Tendência crescente da distribuição das taxas de detecção de sífilis adquirida ao se analisar pelas categorias – sexo (com a inclusão das gestantes com sífilis); idade e raça/cor.
- Acometimento desproporcional das mulheres jovens (menores de 24 anos); homens com menos de 30 anos; pessoas de raça/cor preta e parda.
- Heterogeneidade da distribuição das taxas de detecção de sífilis adquirida segundo a região de residência do caso.



DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS


- 1-Dados clínicos,**
- 2-Resultados de testes diagnósticos,**
- 3- Histórico de infecções passadas e**
- 4-Investigação de exposição recente.**

Quem deve fazer teste de sífilis?

Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes.



Processo completo de monitoramento dos casos com resultado reagente para sífilis FS 2022 período de monitoramento dez de 2022 a jun de 2023



Coluna 1 = Fique Sabendo 2022 - 112.022 TR realizados, 3.694 reagentes; 10.833 convencionais (sem informação sobre reagentes)

Coluna 2 = casos que possuem informações sobre monitoramento

Coluna 3 = Casos diagnosticados com sífilis OU cicatriz sorológica Ou ao final do processo diagnóstico – descartados (não são sífilis)

Coluna 4 = Casos de sífilis ativa


Coluna 5 = Iniciaram tratamento

Coluna 6 = Nº de casos monitorados que foram notificados até maio 2022

Fontes:
Coluna 1 - Formulário 1 = volume total de testes segundo modalidade e Nº de reagentes o primeiro teste (TR)
Demais colunas - Formulário de monitoramento dos casos reagentes tanto convencionais quanto TR







Vinculação dos casos confirmados de sífilis na campanha Fique **Sabendo** 2022





Obrigado!!



Fonte da imagem: <https://www.google.com.br/>



OBRIGADO!!!



🚫 Roberto José Carvalho da Silva, MD, PhD

Programa Estadual de DST/AIDS -SP

Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS

 **E-mail: rjcssp@terra.com.br**

