

ANEXO IV

Calendário de Vacinação para Adultos com 60 anos ou mais de idade¹ - 2011

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINA	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA	dT FEBRE AMARELA ²	PRIMEIRA DOSE DOSE INICIAL
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT	SEGUNDA DOSE
4 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT	TERCEIRA DOSE
ANUALMENTE	INFLUENZA ³	
A CADA 10 ANOS ⁴	dT FEBRE AMARELA ²	REFORÇO

¹ Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado.

² Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica e avaliação do benefício da vacina.

³ Disponível na rede pública durante períodos de campanha.

⁴ Na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.

Nota: Vacina pneumocócica 23-valente – indicada durante as campanhas nacionais de vacinação do Idoso para indivíduos que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso.

De acordo com a RDC ANVISA nº61/2008

dT: vacina adsorvida difteria e tétano adulto

INFLUENZA: vacina influenza (fracionada, inativada)

FEBRE AMARELA: vacina febre amarela (atenuada)

HEPATITE B: vacina hepatite B (recombinante)

PNEUMOCÓCICA 23-VALENTE: vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)